

# AdiCox L

**Účinný přípravek určený pro prevenci infekcí vyvolaných především anaerobními bakteriemi rodu *Clostridium*, *Bacteroides* a *Mycoplasma*. Inhibuje růst plísní a zabraňuje vzniku příznaků kokcidiózy a jiných střevních parazitů.**

**AdiCox L** je kapalná směs rostlinných extraktů a jejich frakcí, které jsou standardizované na obsah účinných látek (v souladu s Pharmacopoea Helvetica 10, Pharmacopoea Europea V, Pharmacopoea Polonica VI et VII). Speciální skladba účinných látek poskytuje sekundární oligodynamický a inhibiční účinek vůči prvokům, plísním a bakteriím.

## **Mechanismus účinku:**

- inhibiční účinek vůči prvokům, bakteriím a plísním
- protizánětlivý, stabilizuje membrány epitelu buněk zažívacího traktu
- stimuluje systém GALT (Gut-Associated Lymphoid Tissue – lymfatické tkáň související se střevem), MALT (Mucose-Associated Lymphoid Tissue - lymfatické tkáň související se sliznicí)
- povzbuzuje tvorbu a vylučování žluči, lipolytický a povrchově aktivní účinek
- povzbuzuje sekreci kyseliny chlorovodíkové v žaludku a zároveň endogenních proteolytických enzymů
- cytotoxický účinek vůči buňkám prvoků a bakterií
- zvyšuje počet lymfocytů T $\gamma$  $\delta$ , TNF a NK. Lymfocyty T $\gamma$  $\delta$  stimulují syntézu cytokinů, které urychlují hojení membrán buněk epitelu poškozeného infekcí bakterií a prvoků.

**Dávkování:** jako přírodní stimulant užitkovosti a profylaktikum proti vzniku infekcí vyvolaných anaerobními bakteriemi, viry a plísněmi: 1 l/1000 l pitné vody anebo tekutého krmiva.

## **Drůbež:**

<u>Indikovaně:</u>	1 l/1000 l vody po dobu 3 – 5 dní
<u>Růstově podpůrně:</u>	0,5 l/1000 l pitné vody po dobu 2 – 3 dní opakovat každých 5 – 6 dnů
<u>Po celou dobu výkrmu:</u>	<b>BR1</b> 220 ml/1000 l vody (nepodáváme jeden den před a jeden den po vakcinaci) <b>BR2</b> 180-200 ml/1000 l vody <b>BR3</b> 120-150 ml/1000 l vody

## **Prasata:**

**Selata** 0,15 – 0,25 ml/kg ž.hm. po předchozím rozmíchání v mléce anebo vodě.  
**Výkrm** nad 75 kg: 0,1 ml/kg ž.hm. rozmíchané ve vodě anebo tekutém krmivu

## **Přezvýkavci:**

**Telata** 0,2 ml/kg ž.hm. rozmíchané ve vodě anebo tekutém krmivu.  
**Žír:** 0,1 ml/kg ž.hm. ve vodě anebo v tekutém krmivu..

## **Králíci:**

0,1 ml/kg ž.hm.

## **Holubi a okrasní ptáci:**

1 ml/10 l vody anebo 1 ml/kg ž.hm.

**AdiCox L** jako digestivum pro zlepšení trávení a příjem krmiv: 5 ml/10 l vody anebo tekutého krmiva

**Doporučená doba podávání** je 3 – 5 dní.

**Nežádoucí účinky:** nejsou známe

**Interakce a ochranná lhůta:** koncentrovaný přípravek nesmíchejte s jinými preparáty. Jiné preparáty podávejte s časovým odstupem 3 – 4 hodiny. Nemá žádnou ochrannou lhůtu.

**Balení:** Láhev 1 l, kanystr 5 l, kanystr 25 l

**Upozornění:**

Před upotřebením protřepat.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky v originálním balení, 2 hodiny po rozředění ve vodě.

Přípravek je silně koncentrovaný. Po rozředění se projasní. Nezachytává se na filtrech dávkovačů vody. Skladujte v chladnu a temnu, mimo dosah dětí.

Zabraňte promrznutí přípravku.

**Dodává:**

BIOFERM CZ spol. s r.o.

Banskobystrická 55, 621 00 Brno

Tel 541 422 550, Fax 545 247 600

[www.bioferm.com](http://www.bioferm.com)